

การศึกษาการใช้แบคทีเรียที่สร้างสารลดแรงตึงผิวชีวภาพและเอนไซม์ ไลเปสในการย่อยสลายไขมันและน้ำมัน

อลงกฎ แซมสีม่วง^{a*} ศิริพรรณ สารินทร์^b และ จรูญ สารินทร์^a

Study of biosurfactant and lipase producing bacteria for degradation fat oil and grease

Alongkot Samsrimuang^{a*}, Siripun Sarin^b and Charoon Sarin^a

^aภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

^bภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

^aDepartment of Natural Resources and Environment, Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment,
Naresuan University, Phitsanulok Province.

^bDepartment of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok
Province.

*Corresponding Author. E-mail address: oalongkoto@hotmail.com

บทคัดย่อ

Bacillus subtilis TP8 และ *Pseudomonas fluorescens* G7 เป็นแบคทีเรียที่สร้างสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ (biosurfactant) ที่แยกได้จากดินที่ปนเปื้อนน้ำมัน ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่แบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้จะสามารถสร้างเอนไซม์ไลเปสซึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยสลายไขมันและน้ำมันจากพืชหรือสัตว์ได้ด้วย ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงทำการทดสอบการสร้างเอนไซม์ไลเปส ด้วยวิธี Tributyrin agar medium และ Chromogenic plates พบว่าแบคทีเรียทั้งสองชนิดสามารถสร้างเอนไซม์ไลเปสได้ เมื่อนำไปวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส (lipase activity) ที่เวลา 48-96 ชั่วโมง พบว่าเชื้อ *B. subtilis* TP8 และ *P. fluorescens* G7 มีค่า lipase activity เท่ากับ 0.0168-0.0319 และ 0.0155-0.0230 U/ml ตามลำดับ สำหรับประสิทธิภาพการย่อยสลายไขมันและน้ำมันโดยการวิเคราะห์ไขมันและน้ำมันที่เหลือหลังจากถูกย่อยด้วยเอนไซม์ไลเปส และ removal efficiency percentages (RE %) โดยใช้เชื้อ *B. subtilis* TP8, *P. fluorescens* G7 และแบคทีเรียผสมทั้งสองชนิด นั้น พบว่า *P. fluorescens* G7 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายไขมันและน้ำมันได้ดีที่สุดที่ชั่วโมงที่ 96 ซึ่งมีค่า RE % เท่ากับ 89.65 รองลงมา คือ แบคทีเรียผสมทั้งสองชนิด และ *B. subtilis* TP8 ที่มีค่า RE % เท่ากับ 86.88 และ 86.50 ตามลำดับ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า *P. fluorescens* G7 ที่มีการสร้างสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเชื้อ *B. subtilis* TP8 ซึ่งจะช่วยให้ไขมันและน้ำมันแตกตัวเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก จึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ไลเปสในการย่อยสลายไขมันและน้ำมันได้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ: *Bacillus subtilis* TP8, *Pseudomonas fluorescens* G7, สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ เอนไซม์ไลเปส

Abstract

Bacillus subtilis TP8 and *Pseudomonas fluorescens* G7 are biosurfactant producing bacteria isolated from oil contaminated soil which may be possible to produce of lipase. In this study, lipase production was determined by tributyrin agar medium and chromogenic plates methods. It was found that both bacteria were positive for lipase production. Analysis of lipase activity at 48–96 hours, the results revealed that were 0.0168–0.0319 and 0.0155–0.0230 U/ml for *B. subtilis* TP8 and *P. fluorescens* G7, respectively. Efficiency of fat, oil and grease (FOG) degradation, was determined by analysis of final FOG level and removal efficiency percentages (RE %) after treatment using *B. subtilis* TP8, *P. fluorescens* G7 and mix cultures. The result found that *P. fluorescens* G7 gave the highest degradation efficiency of 89.65 % removal at 96 hours of incubation time, while the mix cultures and *B. subtilis* TP8 were 86.88 and 86.50 % of removal, respectively. Interestingly, the biosurfactant produced by *P. fluorescens* G7 giving higher emulsification activity than *B. subtilis* TP8 may be important factor to form small droplets of FOG suspended in water leading to increase efficiency of lipase for FOG degradation.

Keywords: *Bacillus subtilis* TP8, *Pseudomonas fluorescens* G7, biosurfactant, lipase

บทนำ

น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) เป็นสารอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติได้มาจากพืชหรือสัตว์ ลักษณะทั่วไปของน้ำมันและไขมันจะมีน้ำหนักเบาและลอยน้ำ น้ำมันและไขมันจะพบในน้ำเสียที่มาจากการเตรียมและการประกอบอาหารเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่พบในน้ำเสียครัวเรือน มีปริมาณร้อยละ 10 ของปริมาณสารอินทรีย์ทั้งหมดและเป็นอินทรีย์สารที่มีเสถียรภาพและย่อยสลายได้ยาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) น้ำเสียจากบ้านเรือนที่มีน้ำมันและไขมันปนเปื้อนส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาหารของบ้านเรือน มีประมาณ 500 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งจากการคาดการณ์โดยการคำนวณประสิทธิภาพของบ่อดักไขมันที่ร้อยละ 60 พบว่ามีปริมาณไขมันจากบ่อดักไขมันของบ้านเรือนเท่ากับ 0.8 และ 0.2 กิโลกรัม/วัน-ครัวเรือน ซึ่งขึ้นอยู่กับกาติดตั้งและไม่ติดตั้งตะแกรงดักเศษอาหาร ตามลำดับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2538; สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2536) ซึ่งน้ำมันและไขมันเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาเมื่อปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยอาจปนเปื้อนสู่ดินและแหล่งน้ำผิวดินโดยตรง ทำให้เกิดสภาพไม่น่าดู และขวางกั้นการซึมผ่านของออกซิเจนจากอากาศลงสู่แหล่งน้ำและขัดขวางการซึมผ่านของแสงทำให้พืชในแหล่งน้ำไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ เนื่องจากไขมันจะแผ่ปกคลุมผิวน้ำ มีผลทำให้ออกซิเจนไม่สามารถละลายสู่ได้ ก่อให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน เกิดกลิ่นเน่าเหม็น และยังทำให้ท่อบายน้ำทั้งอุดตัน เกิดปัญหากลิ่นเหม็นไขมันจากท่อน้ำทิ้ง ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียตามมาได้

กระบวนการที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำมันและไขมันปนเปื้อนนั้น มีทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ ซึ่งพบว่าการบำบัดทางด้านกายภาพ เช่น การใช้ถังดักไขมัน การใช้ระบบเติมอากาศทำให้เกิดการลอยตัวของไขมัน โดยการบำบัดด้วยวิธีนี้เหล่านี้มีประสิทธิภาพต่ำและยังไม่เพียงพอในกรณีที่มีการแพร่กระจายของน้ำมันและไขมันในน้ำเสีย ดังนั้น การบำบัดทางชีวภาพจึงเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่ดีสำหรับการกำจัดน้ำมันและไขมันในน้ำเสียได้ โดยน้ำมันและไขมันเหล่านี้จะถูกย่อยสลายให้เป็นโมเลกุล

ขนาดเล็กที่จุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายน้ำมันและไขมันต้องเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างเอนไซม์ไลเปสได้ โดยจุลินทรีย์ในกลุ่มที่สร้างเอนไซม์ไลเปส จะสามารถกำจัดน้ำมันและไขมันให้มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการแตกตัวของน้ำมันและไขมันในน้ำเสียด้วย ซึ่งการที่จะทำให้ น้ำมันและไขมันในน้ำเสียแตกตัวอยู่ในรูปที่จะถูกย่อยสลายต่อไปได้โดยการใช้สารลดแรงตึงผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าว ซึ่งพบว่าจุลินทรีย์กลุ่มหนึ่งที่สามารถสร้างสารลดแรงตึงผิวชีวภาพได้ ดังนั้น การนำเอาจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพและเอนไซม์ไลเปสมาประยุกต์ใช้ในการย่อยสลายน้ำมันและไขมันจึงจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำมันและไขมันในน้ำเสียได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้แบคทีเรียที่สามารถสร้างสารลดแรงตึงผิวชีวภาพและเอนไซม์ไลเปสในการย่อยสลายน้ำมันและไขมัน ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาไปสู่การจัดการสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนน้ำมันและไขมันต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

(1). การศึกษาการสร้างเอนไซม์ไลเปสของแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ

นำแบคทีเรียบริสุทธิ์ *Bacillus subtilis* TP8 และ *Pseudomonas fluorescens* G7 ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่แยกได้จากดินบริเวณชุ่มน้ำที่มีการปนเปื้อนน้ำมัน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีความสามารถในการสร้างสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่มีค่า Emulsification activity (EA_{24}) เท่ากับ 40.62 ± 0 และ 45.31 ± 2.2 ตามลำดับ (กฤษดา, 2552) มาทำการเชื้อโคลนเชื้อลงบน Nutrient agar (NA) แล้วนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำไปทดสอบการสร้างเอนไซม์ไลเปสและกิจกรรมของเอนไซม์ ตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3

1.1 วิธี Tributyrin agar medium ซึ่งเป็นการทดสอบขั้นต้น (Chappe et al., 1994) โดยเชื้อโคลนเชื้อและซัดเชื้อลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ Tributyrin agar จากนั้นนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำมาแปลผล คือ ถ้าบริเวณรอบๆ เชื้อเกิดรอยใส (clear zone) แสดงว่าเชื้อมีการผลิตเอนไซม์ไลเปสออกมาย่อยสลาย tributyrin ซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่อยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ

1.2 วิธี Chromogenic plates ซึ่งเป็นการทดสอบขั้นยืนยัน (Singh R. et al., 2006) โดยเชื้อเชื้อและซัดเชื้อลงบนผิวหน้าอาหาร chromogenic agar แล้วนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้นนำมาแปลผล คือ ถ้าสีของอาหารเลี้ยงเชื้อเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีเหลือง แสดงว่าเชื้อมีการผลิตเอนไซม์ไลเปสออกมาย่อยสลาย tributyrin และปล่อยกรดไขมัน (fatty acid) ออกมาทำให้ pH ลดลงมีสภาพเป็นกรด จึงทำให้สีของอาหารเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีเหลือง

1.3 ทดสอบ lipase activity (Ertugrul S. et al., 2007) โดยทำการเชื้อเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์ *B. subtilis* TP8, *P. fluorescens* G7 ในข้อ (1) จำนวน 1 หลอด ลงในฟลาสขนาด 250 มล. ที่บรรจุอาหารเหลว Mineral Salt Medium (MSM) ที่มีน้ำมันพืช 2.0 เปอร์เซ็นต์ บ่มในเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียส ความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 48, 72 และ 96 ชั่วโมง จากนั้นทำการเหวี่ยงแยก

เซลล์ออกที่ความเร็วรอบ 14,000 rpm เป็นเวลา 5 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เก็บส่วนใสข้างบน หรือส่วน supernatant ซึ่งมี extracellular enzyme ไว้ในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยการทดสอบ lipase activity จะใช้วิธีการพื้นฐานของ colorimetric estimation โดยผสมสารละลายตั้งต้นจำนวน 9 มิลลิลิตร กับ 1 มิลลิลิตร ของ extracellular enzyme แล้วนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 410 นาโนเมตร นำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน (standard curve) โดยกำหนด 1 unit ของ enzyme activity คือ ปริมาณของเอนไซม์ ที่ทำให้มีการปล่อย pNP ออกมา 1 μmol ในเวลา 1 นาที

(2). การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่สร้างสารลดแรงตึงผิวชีวภาพและเอนไซม์ไลเปสในการย่อยสลายไขมันและน้ำมัน

ทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่สร้างสารลดแรงตึงผิวชีวภาพและเอนไซม์ไลเปสการย่อยสลายไขมันและน้ำมัน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ Fat Oil and Grease (FOG) (มันสิน และมันรักษ์, 2551) โดยทำการเชื้อเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์ *B. subtilis* TP8, *P. fluorescens* G7 ในข้อ (1) จำนวน 1 หลบ ลงในพลาสติก ขนาด 250 มล. ที่บรรจุอาหารเหลว Mineral Salt Medium (MSM) ที่มีน้ำมันพืช 2.0 เปอร์เซ็นต์ บ่มในเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียส ความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 48,72 และ 96 ชั่วโมง แล้วทำการปรับพีเอชตัวอย่างน้ำที่จะทำการตรวจวิเคราะห์ให้น้อยกว่า 2 ด้วยกรดเกลือเข้มข้นในอัตราประมาณ 5 มิลลิลิตร ต่อตัวอย่าง 1 ลิตร จากนั้นกรองตัวอย่างน้ำผ่านบนกระดาษกรองที่มีแผ่นกรองดูดซับน้ำมันอยู่ หลังจากนั้นใช้คีมคีบกระดาษกรองนำไปใส่ในทิมเบล ใช้สาล์ชุบเฮกเซนเช็ดไขมันที่ติดถ้วยบुकเนอร์ให้หมด แล้วนำสาล์ใส่ในทิมเบลด้วย นำทิมเบลไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ใส่เม็ดแก้วให้เต็มทิมเบล โดยชั่งน้ำหนักขวดที่ใช้สกัดซึ่งได้ทำให้แห้งและมีน้ำหนักคงที่ (อบแห้งที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส) สมมุติเท่ากับ A กรัม ใส่เฮกเซนลงในขวดสกัด 200 มิลลิลิตร นำทิมเบลใส่ในชุดชอกซ์เลต ทำการสกัดโดยใช้เฮกเซนเป็นตัวทำละลายด้วยอัตรา 20 รอบต่อชั่วโมง เป็นเวลา 4 ชั่วโมง กลั่นเฮกเซนจากขวดสกัดในเครื่องอ่างน้ำที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ออกจนแห้ง ปล่อยขวดสกัดให้เย็นในโถทำแห้ง 30 นาที แล้วนำไปชั่งน้ำหนัก สมมุติเท่ากับ B กรัม นำค่าที่ได้ไปคำนวณ ดังสมการนี้

$$\text{ไขมันและน้ำมัน (มก./ลิตร)} = \frac{(B-A) \times 10^6}{\text{ปริมาณตัวอย่าง (มล.)}}$$


โดยนำค่าที่ได้มาคำนวณหาประสิทธิภาพในการย่อยสลายไขมันและน้ำมันในน้ำตัวอย่าง (EL-Masry et al., 2004) จากสูตร

$$\% \text{ Efficiency of Fat oil and grease removal} = \frac{\text{Initial FOG level in the raw water} - \text{Final FOG level after treatment}}{\text{Initial FOG in the raw water}} \times 100$$

ผลการศึกษา


ผลการศึกษาการสร้างเอนไซม์ไลเปสของแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ

พบว่าแบคทีเรียทั้ง *B. subtilis* TP8 และ *P. fluorescens* G7 ผลิตเอนไซม์ไลเปสออกมาย่อย Tributyrin ที่เป็นสับสเตรทเพื่อนำไปสังเคราะห์เป็นพลังงานและองค์ประกอบของเซลล์ ทำให้เกิดรอยใสรอบโคโลนีบนอาหาร Tributyrin agar (รูปที่ 1) และยังพบว่าแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิด มีการผลิตเอนไซม์ไลเปสออกมาย่อยสลาย Tributyrin และปล่อย fatty acid ออกมาทำให้ pH ลดลงมีสภาพเป็นกรด จึงทำให้สีของอาหาร chromogenic agar เปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีเหลือง (รูปที่ 2) แสดงว่าแบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ไลเปสได้ จึงทำการวิเคราะห์หา lipase activity แล้วนำค่าที่ได้เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน พบว่าเชื้อ *B. subtilis* TP8 และ *P. fluorescens* G7 ให้ค่า lipase activity เท่ากับ 0.0168-0.0319 และ 0.0155-0.0230 ตามลำดับ ในระหว่างช่วงเวลาที่ 48-96 ชั่วโมง (ตารางที่ 1)



รูปที่ 1 แสดง clear zone บริเวณที่ขีดเชื้อ บนอาหาร Tributyrin agar โดยที่

(a) เชื้อ *B. subtilis* TP8 และ (b) เชื้อ *P. fluorescens* G7



รูปที่ 2 แสดงการเปลี่ยนสีของอาหาร chromogenic agar เปลี่ยนจากสีชมพูเป็น

สีเหลือง โดยที่ (a) เชื้อ *B. subtilis* TP8 และ (b) เชื้อ *P. fluorescens* G7

ตารางที่ 1 ผลการสร้างเอนไซม์ไลเปส และ ค่า lipase activity ของแบคทีเรียทดสอบ

Isolates	Tributylin agar	chromogenic plate	Extracellular lipase activity (U/ml)		
			48 h	72 h	96 h
<i>B. subtilis</i> TP8	+	+	0.0168 ± 0.0001	0.0319 ± 0.0005	0.0269 ± 0.0002
<i>P. fluorescens</i> G7	+	+	0.0155 ± 0.0002	0.0207 ± 0.0006	0.0230 ± 0.0020

หมายเหตุ + คือให้ผลบวกกับการทดสอบของ Tributyrin agar medium, chromogenic plate

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่สร้างสารลดแรงตึงผิวชีวภาพและเอนไซม์ไลเปสในการย่อยสลายไขมันและน้ำมัน

จากการวิเคราะห์ FOG ที่เหลืออยู่หลังจากทำการย่อยสลายไขมันด้วยเอนไซม์ lipase จากเชื้อ *B. subtilis* TP8, *P. fluorescens* G7 และ mix culture ระหว่าง *B. subtilis* TP8 และ *P. fluorescens* G7 พบว่า จากปริมาณ FOG เริ่มต้น 8810 mg/l ลดลงเหลือ 1189, 912 และ 1156 mg/l ในชั่วโมงที่ 96 ตามลำดับ และเมื่อนำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพในการย่อยสลายไขมันและน้ำมัน (Removal efficiency %, RE) พบว่าเชื้อสามารถย่อยสลายไขมันได้สูงถึง 86.50, 89.65 และ 86.88 % ตามลำดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ผลการย่อยสลายไขมันและน้ำมันของแบคทีเรียทดสอบ

Isolates	FOG เริ่มต้น (mg/l)	FOG ที่เหลือหลังจากย่อยสลายด้วยเอนไซม์ lipase, mg/l (removal efficiency %)		
		48 h	72 h	96 h
<i>B. subtilis</i> TP8	8810	6632 (24.72)	3142 (64.34)	1189 (86.50)
<i>P. fluorescens</i> G7	8810	2593 (70.56)	946 (89.26)	912 (89.65)
mix culture	8810	3334 (62.16)	1527 (82.67)	1156 (86.88)

อภิปรายผลการวิจัย

จากการทดสอบการสร้างเอนไซม์ไลเปสของ *B. subtilis* TP8 และ *P. fluorescens* G7 ทั้งขึ้นต้นและขึ้นยีสันผล โดยวิธี Tributyrin agar medium และ Chromogenic plates แสดงให้เห็นว่าเชื้อทั้งสองชนิดที่มีคุณสมบัติในการสร้างสารลดแรงตึงผิวชีวภาพนั้น ยังสามารถสร้างเอนไซม์ไลเปสได้อีกด้วย ซึ่งเคยมีรายงานมาก่อนนี้ของเชื้อ *Bacillus* sp. (Ertugrul et al., 2007) และ เชื้อ *Pseudomonas fluorescens* (Kojima & Shinizu, 2003) ที่สร้างเอนไซม์ไลเปสได้ด้วยเช่นกัน เมื่อนำเชื้อมาทดสอบหาค่า lipase activity พบว่าเชื้อ *B. subtilis* TP8 มีค่า lipase activity สูงกว่า *P. fluorescens* G7 ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบการสร้างเอนไซม์ไลเปสโดยวิธี Tributyrin agar medium ที่ขนาด clear zone ของเชื้อ *B. subtilis* TP8 มีขนาดกว้างกว่า clear zone ของเชื้อ *P. fluorescens* G7 เมื่อเวลาผ่านไป 24-48 ชั่วโมง แสดงให้เห็นว่าเชื้อ *B. subtilis* TP8 มีกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปสดีกว่าเชื้อ *P. fluorescens* G7 และเมื่อนำเชื้อทั้งสองชนิดมาทำการทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายไขมัน กลับพบว่าเชื้อ *P. fluorescens* G7 มีประสิทธิภาพในการย่อย

สลายไขมันและน้ำมันได้ดีที่สุด รองลงมาคือ mix culture และ เชื้อ *B. subtilis* TP8 ตามลำดับ โดยการใช้การวิเคราะห์ไขมันและน้ำมันที่เหลือหลังจากการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ไลเปส และค่า %Removal efficiency ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า สารลดแรงตึงผิวชีวภาพในเชื้อ *P. fluorescens* G7 ที่มีมากกว่าเชื้อ *B. subtilis* TP8 มีส่วนสำคัญในการช่วยให้เอนไซม์ไลเปสเข้าไปทำปฏิกิริยาได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากสารลดแรงตึงผิวชีวภาพมีคุณสมบัติเป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นแอมฟิพาติก (amphipathic) โดยมีขั้วทั้งสองข้างที่ประกอบด้วย ส่วนที่ไม่ชอบน้ำ (hydrophobic) และส่วนที่ชอบน้ำ (hydrophilic) ซึ่งคุณสมบัติของสารเหล่านี้มีผลมาจากการรวมตัวกันของสารมีขั้วและไม่มีขั้วไว้ในโมเลกุลเดียวกัน (Cooper et al., 1980; Desai & Banat, 1997) ทำให้ไขมันและน้ำมันแตกตัวเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เอนไซม์ไลเปสเข้าไปทำปฏิกิริยาย่อยสลายไขมันและน้ำมันได้เป็นอย่างดี

สรุปผลการวิจัย

เชื้อ *P. fluorescens* G7 และ *B. Subtilis* TP8 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายไขมันและน้ำมัน โดยอาศัยคุณสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพร่วมกับการทำงานของเอนไซม์ไลเปส จึงช่วยลดปริมาณไขมันและน้ำมันลงได้

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เอื้อเฟื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำวิจัย

เอกสารอ้างอิง

- กฤษฎา บุญชัย. (2552). การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ เพื่อใช้บำบัดดินที่มีการปนเปื้อนแคดเมียมและสังกะสี. วิทยานิพนธ์ วท.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
- กรมควบคุมมลพิษ. (2538). คู่มือเล่มที่ 3 แนวทางควบคุมปัญหาน้ำเสีย สำหรับองค์กรบริหารท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์.
- กรมควบคุมมลพิษ. (2546). คู่มือแนวทางการจัดการกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย.
- มันสิน ตันทุลเวศม์ และมันรัช ตันทุลเวศม์. (2551). คู่มือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (2536). ข้อพิจารณาเกี่ยวกับปริมาณและลักษณะน้ำทิ้งชุมชนในประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชุม สวสท'36.

- Chappe, P., Mourey, A. & Kibertus, G. (1994). Variation of lipolitec activity in the genus *Acinetobacter* sp. *Journal of General & Applied Microbiology*, 4, 103–114.
- Cooper, D.G., Zajic, J.E., Gerson, D.E. & Manninen, K.I. (1980). Isolation and identification of biosurfactant produced during anaerobic growth of *Clostridium pasteurianum*. *Journal of Fermentation Technology*, 58, 83–86.
- Desai, J.D. & Banat, I.M. (1997). Microbial production of surfactant and their commercial potential. *Microbial. Microbiology & Molecular Biology Reviews*, 61(1), 47–64.
- EI-Masry, M.H., EI-Bestawy, E. & EI-Adl, N.I. (2004). Bioremediation of vegetable oil and grease from polluted wastewater using a sand biofilm system. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 20, 551–557.
- Ertugrul, S., Donmez, G. & Takac, S. (2007). Isolation of lipase producing *Bacillus* sp. from olive mill wastewater and improving its enzyme activity. *Journal of Hazardous Materials*, 149, 720–724.
- Kojima, Y & Shinizu, S. (2003). Purification and characterization of the lipase from *Pseudomonas fluorescens* HU380. *Journal of Bioscience & Bioengineering*, 96, 219–226.
- Singh, R., Gupta, N., Goswami, V.K. & Gupta, R. (2006). A sample activity staining protocol for lipases and esterases. *Applied Microbiology & Biotechnology*, 70, 679–682.